

Tableau de bord de l'analyse de situation

REACH Haïti

- Pas un problème grave (↗) Amélioration; tendance positive
- Problème qui requiert une action (↘) Détérioration; tendance négative
- Problème sérieux nécessitant une action urgente (→) Stagnation ou quasi-stagnation

| | | Indicateurs | Statut | Sévérité | Tendance | Sources |
|------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Impact nutritionnel | Malnutrition chronique | Prévalence de malnutrition chronique chez les 6-59 mois | 21.9% | ● | ↗ | EMMUS 2012 |
| | Malnutrition aigue | Prévalence MAG chez les 6-59 mois | 5.1% | ● | ↗ | EMMUS 2012 |
| | | Prévalence MAS chez les 6-59 mois | 1.2% | ● | ↗ | EMMUS 2012 |
| | Carence en vitamine A | Enfants ayant une carence en vitamine A | 32.0% | ● | n/a | UNICEF MSPP 2006 |
| | | Femmes enceintes atteintes d'héparanopie ₁ | 9.4% | ● | n/a | WHO 2000 |
| | | Enfants atteints d'héparanopie ₁ | 0.7% | ● | n/a | WHO 2000 |
| | Carence en fer | Enfants 6-59 mois anémiés | 65.0% | ● | ↘ | EMMUS 2012 |
| | | Femmes 15-49 ans anémiées | 49.3% | ● | ↘ | EMMUS 2012 |
| Carence en iode | Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans | MUI: 84µg/L | ● | n/a | UNICEF MSPP 2006 | |
| Facteurs sous-jacents | Sécurité alimentaire | Ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou limite | 16.0% | ○ | → | ENSAN 2013 |
| | | Prévalence de la sous-alimentation | 51.8% | ● | → | WB/ FAO 2013 |
| | | Ménages ayant une diversité alimentaire pauvre ou moyenne | 18% | ○ | ↔ | ENSAN 2013 |
| | | Indice de la faim dans le monde | 23 | ● | ↗ | GHI 2014, IFPRI |
| | Santé, eau et assainissement | Mortalité des moins de 5 ans (morts pour 1000 naissances vivantes) | 88 p 1000 | ● | → | EMMUS 2012 |
| | | Faible poids à la naissance | 19% | ○ | ↘ | EMMUS 2012 |
| | | Femmes 15-49 ans qui ont des problèmes pour accéder aux soins de santé | 81.9% | ○ | ↗ | EMMUS 2012 |
| | | Accès des ménages à une source d'eau améliorée | 64.8% | ● | ↗ | EMMUS 2012 |
| | Soins | Accès des ménages à des toilettes améliorées | 25.7% | ○ | ↘ | EMMUS 2012 |
| | | Initiation précoce de l'allaitement | 46.7% | ○ | ↗ | EMMUS 2012 |
| | | Allaitement exclusif chez les 0-5 mois | 39.7% | ○ | → | EMMUS 2012 |
| | | Enfants 6-23 mois recevant une alimentation complémentaire appropriée | 13.6% | ○ | n/a | EMMUS 2012 |
| | | Temps pour l'approvisionnement en eau (> 30 min) | 34.4% | ○ | ↘ | EMMUS 2012 |
| | | Ménages qui disposent d'eau et de savon pour le lavage des mains parmi ceux disposant d'un endroit pour se laver les mains | 34.6% | ○ | n/a | EMMUS 2012 |
| Causes fondamentales | Education | Taux d'alphabétisme des femmes | 73.6% | ○ | ↗ | EMMUS 2012 |
| | Population | Taux de fécondité par femme | 3.5 | ○ | → | EMMUS 2012 |
| | Genre | Femmes 20-49 ans qui ont donné naissance à leur 1er enfant avant 15 ans | 2.0% | ○ | n/a | EMMUS 2012 |
| | | Participation des femmes à la prise de décisions au sein du ménage | 60.8% | ○ | n/a | EMMUS 2012 |
| | Pauvreté | Population vivant sous le seuil national de pauvreté | 58.5% | ○ | n/a | BM 2014 / ECVMAS 2012 |
| | | Index GINI | 32.7% | ○ | n/a | EMMUS 2012 |
| | Index de pauvreté multidimensionnel | 0.248 | ○ | n/a | UNDP 2014 | |