

Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, niveau national

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable

n.d. Données non disponibles
n.a. Données non applicables

| | | Indicateurs | Statut | Source | Année | Sévérité | Tendance |
|-------------------------|--|---|---|----------------------------|-------|----------|----------|
| Impact Nutritionnel | Malnutrition chronique | % de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois | 45,5% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | Malnutrition aigue | % de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois | 14,8% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | % de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois | 2,7% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | Carence en vitamine A | % des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A ¹ | 67% | WHO | 1995 | ● | n.d. |
| | Carence en fer | % des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie | 73,4% | EDS | 2012 | ● | ↘ |
| | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie | 45,8% | EDS | 2012 | ● | ↘ |
| Carence en iode | Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans | n/a | n/a | n/a | ○ | n/a | |
| Causes Sous-jacentes | Sécurité alimentaire | % des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire | 45,6% | Enquête Vulnérabilité | 2011 | ○ | ↗ |
| | | Classement pour l'indice de la faim dans le monde | 94/104 | IFPRI | 2015 | ○ | ↗ |
| | Santé et assainissement | Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) | 127 | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé | 70,2% | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | % de ménages ayant accès à l'eau potable | 53,5% | MHA | 2013 | ○ | ↗ |
| | | % de ménages qui n'ont pas de toilettes/nature | 72,7% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | Soins | % d'initiation précoce de l'allaitement | 52,9% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | % d'allaitement exclusif chez les enfants de 0 à 5 mois | 23,3% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | % des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE | 5,6% | EDS | 2012 | ○ | n.d. |
| | | % des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clés | 34,8% | Enq. Survie de l'enfant | 2009 | ○ | n.d. |
| | | % de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII | 13,8% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | Causes Fondamentales | Education | % de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus | 10,1% | EDS | 2012 | ○ |
| Population | | Taux de fécondité par femme | 7,6 | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | % de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne | 12,2% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| Genre | | % des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative | 40,4% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Classement pour l'indice d'inégalité de genre | 154/155 | PNUD | 2014 | ○ | ↘ |
| Pauvreté | | % de la population vivant sous le seuil national de pauvreté | 48,9% | Banque Mondiale | 2011 | ○ | n.d. |

¹ Donnée trop ancienne datant de 1995: WHO Global prevalence of vitamin A deficiency in populations at risk.

Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, niveau national

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

| | | Indicateurs | Rural | Sévérité | Urbain | Sévérité | Source | Année |
|-------------------------|--|---|-------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|-------|
| Impact Nutritionnel | Malnutrition chronique | % de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois | 52,1% | ● | 32,4% | ● | SMART | 2014 |
| | Malnutrition aigue | % de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois | 15,8% | ● | 12,8% | ● | SMART | 2014 |
| | | % de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois | 3,1% | ● | 1,9% | ● | SMART | 2014 |
| | Carence en vitamine A | % des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| | Carence en fer | % des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie | 73,9% | ● | 69,8% | ● | EDS | 2012 |
| | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie | 46,5% | ● | 42,4% | ● | EDS | 2012 |
| Carence en iode | Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Causes Sous-jacentes | Sécurité alimentaire | % des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| | Santé et assainissement | Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) | 163 | ○ | 83 | ○ | EDS | 2012 |
| | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé | 72,9% | ○ | 58,1% | ○ | EDS | 2012 |
| | | % de ménages ayant accès à l'eau potable | 49% | ○ | 74% | ○ | MHA | 2013 |
| | | % de ménages qui n'ont pas de toilettes/nature | 83,4% | ○ | 13,7% | ○ | EDS | 2012 |
| | Soins | % d'initiation précoce de l'allaitement | 50% | ○ | 71,8% | ○ | EDS | 2012 |
| | | % d'allaitement exclusif chez les enfants de 0 à 5 mois ¹ | 9,1% | ○ | 14,5% | ○ | Enq. Survie de l'enfant | 2009 |
| | | % des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE | 3,9% | ○ | 15,6% | ○ | EDS | 2012 |
| | | % des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs | 32,7% | ○ | 35,6% | ○ | Enq. Survie de l'enfant | 2010 |
| | | % de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII | 11,5% | ○ | 25,4% | ○ | EDS | 2012 |
| Causes Fondamentales | Education | % de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus | 4,4% | ○ | 34,8% | ○ | EDS | 2012 |
| | Population | Taux de fécondité par femme | 8,1 | ○ | 5,6 | ○ | EDS | 2012 |
| | | % de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne | 9,7% | ○ | 27% | ○ | EDS | 2012 |
| | Genre | % des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative | 47,1% | ○ | 17,2% | ○ | EDS | 2012 |
| | Pauvreté | % de la population vivant sous le seuil national de pauvreté | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Banque Mondiale | 2011 |

¹ Une donnée plus récente (2012) existe pour le niveau national mais cette donnée n'est pas désagrégée par zone de résidence.

Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région d'Agadez

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

| | | Indicateurs | Statut | Source | Année | Sévérité | Tendance | |
|---|---------------|--------------------------------|---|--------|------------------------|----------|---------------------------------------|------|
| Impact | Nutritionnel | Malnutrition chronique | % de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois | 28,2% | SMART | 2014 | ● | ↘ |
| | | Malnutrition aigue | % de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois | 14,4% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | | % de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois | 2,6% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | Carence en vitamine A | % des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A | n.d | n.d | n.d | ○ | n.d. |
| | | Carence en fer | % des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie | 76,7% | EDS | 2012 | ● | ↗ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie | 50% | EDS | 2012 | ● | ↘ |
| | | Carence en iode | Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans | n/a | n/a | n/a | ○ | n/a |
| Causes | Sous-jacentes | Sécurité alimentaire | % des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire | n.d | n.d | n.d | ○ | n.d |
| | | Santé et assainissement | Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) | 51 | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé | 69,8% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Soins | % de ménages ayant accès à l'eau potable | 54% | MHA | 2013 | ○ | ↗ |
| | | | % d'initiation précoce de l'allaitement | 70,7% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | | % des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE | 13,8% | EDS | 2012 | ○ | n.d |
| | | | % des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs | 36% | Enq Survie de l'enfant | 2009 | ○ | n.d |
| % de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII | 14,2% | EDS | 2012 | ○ | ↗ | | | |
| Causes | Fondamentales | Education | % de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus | 23% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Population | Taux de fécondité par femme | 5,7 | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne | 17,8% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Genre | % des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative | 25,6% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |

Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Diffa

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

| | | Indicateurs | Statut | Source | Année | Sévérité | Tendance | |
|---|---------------|--------------------------------|---|--------|------------------------|----------|---------------------------------------|------|
| Impact | Nutritionnel | Malnutrition chronique | % de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois | 42% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | Malnutrition aigue | % de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois | 13,8% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | | % de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois | 1,8% | SMART | 2014 | ● | ↘ |
| | | Carence en vitamine A | % des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A | n.d | n.d | n.d | ○ | n.d. |
| | | Carence en fer | % des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie | 87,9% | EDS | 2012 | ● | ↗ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie | 17,1% | EDS | 2012 | ● | ↗ |
| | | Carence en iode | Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans | n/a | n/a | n/a | ○ | n/a |
| Causes | Sous-jacentes | Sécurité alimentaire | % des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire | 59,4% | Enq Vulnérabilité | 2011 | ○ | ↗ |
| | | Santé et assainissement | Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) | 41 | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé | 76,3 | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Soins | % de ménages ayant accès à l'eau potable | 46% | MHA | 2013 | ○ | ↗ |
| | | | % d'initiation précoce de l'allaitement | 83% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | | % des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE | 8,4% | EDS | 2012 | ○ | n.d |
| | | | % des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs | 10,6% | Enq Survie de l'enfant | 2009 | ○ | n.d |
| % de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII | 11,9% | EDS | 2012 | ○ | ↗ | | | |
| Causes | Fondamentales | Education | % de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus | 6,6% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Population | Taux de fécondité par femme | 6,4 | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | | % de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne | 11,5% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Genre | % des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative | 43,1% | EDS | 2012 | ○ | ↘ |

Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Dosso

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

| | | Indicateurs | Statut | Source | Année | Sévérité | Tendance | |
|--------|---|--------------------------------|---|--------|------------------------|----------|----------|------|
| Impact | Nutritionnel | Malnutrition chronique | % de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois | 31,5% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | Malnutrition aigue | % de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois | 14,2% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | | % de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois | 2,4% | SMART | 2014 | ● | ↘ |
| | | Carence en vitamine A | % des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A | n.d | n.d | n.d | ○ | n.d. |
| | | Carence en fer | % des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie | 75,4% | EDS | 2012 | ● | ↘ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie | 58,1% | EDS | 2012 | ● | ↗ |
| | | Carence en iode | Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans | n/a | n/a | n/a | ○ | n/a |
| Causes | Sous-jacentes | Sécurité alimentaire | % des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire | 43,6% | Enq Vulnérabilité | 2011 | ○ | ↗ |
| | | Santé et assainissement | Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) | 190 | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé | 58% | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % de ménages ayant accès à l'eau potable | 62% | MHA | 2013 | ○ | ↗ |
| | | Soins | % d'initiation précoce de l'allaitement | 57,1% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | | % des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE | 3,4% | EDS | 2012 | ○ | n.d |
| | | | % des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs | 52,3% | Enq Survie de l'enfant | 2009 | ○ | n.d |
| | % de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII | 16,2% | EDS | 2012 | ○ | ↗ | | |
| Causes | Fondamentales | Education | % de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus | 8,5% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Population | Taux de fécondité par femme | 7,5 | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | | % de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne | 18% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Genre | % des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative | 33% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |

Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Maradi

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

| | | Indicateurs | Statut | Source | Année | Sévérité | Tendance | |
|--------|---|--------------------------------|---|--------|---------------------------|----------|----------|------|
| Impact | Nutritionnel | Malnutrition chronique | % de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois | 55,9% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | Malnutrition aigue | % de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois | 15,7% | SMART | 2014 | ● | ↘ |
| | | | % de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois | 3,4% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | Carence en vitamine A | % des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A | n.d | n.d | n.d | ○ | n.d. |
| | | Carence en fer | % des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie | 68,7% | EDS | 2012 | ● | ↘ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie | 42,7% | EDS | 2012 | ● | ↘ |
| | | Carence en iode | Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans | n/a | n/a | n/a | ○ | n/a |
| Causes | Sous-jacentes | Sécurité alimentaire | % des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire | 39,9% | Enq Vulnérabilité | 2011 | ○ | ↗ |
| | | Santé et assainissement | Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) | 166 | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé | 74,8% | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % de ménages ayant accès à l'eau potable | 49% | MHA | 2013 | ○ | ↗ |
| | | Soins | % d'initiation précoce de l'allaitement | 40,7% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | | % des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE | 3,7% | EDS | 2012 | ○ | n.d |
| | | | % des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs | 23,7% | Enq Survie de l'enfant | 2009 | ○ | n.d |
| | % de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII | 11,3% | EDS | 2012 | ○ | ↗ | | |
| Causes | Fondamentales | Education | % de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus | 6,4% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Population | Taux de fécondité par femme | 8,4 | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne | 6,9% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Genre | % des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative | 43,6% | EDS | 2012 | ○ | ↘ |

Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Niamey

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d.** Données non disponibles

| | | Indicateurs | Statut | Source | Année | Sévérité | Tendance |
|-------------------------|---|---|--------|-------------------------|--|--|----------|
| Impact Nutritionnel | Malnutrition chronique | % de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois | 24% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | Malnutrition aigue | % de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois | 12,8% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | % de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois | 1,4% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | Carence en vitamine A | % des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A | n.d. | n.d. | n.d. | | n.d. |
| | Carence en fer | % des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie | 78,5% | EDS | 2012 | ● | ↗ |
| | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie | 47,4% | EDS | 2012 | ● | ↗ |
| | Carence en iode | Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans | n/a | n/a | n/a | | n/a |
| Causes Sous-jacentes | Sécurité alimentaire | % des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire | 31,2% | Enq. Vulnérabilité | 2011 | | ↗ |
| | Santé et assainissement | Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) | 80 | EDS | 2012 | | ↘ |
| | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé | 67% | EDS | 2012 | | ↗ |
| | | % de ménages ayant accès à l'eau potable | 49% | MHA | 2013 | | ↗ |
| | Soins | % d'initiation précoce de l'allaitement | 64,3% | EDS | 2012 | | ↗ |
| | | % d'allaitement exclusif chez les enfants de 0 à 5 mois | 7% | EDS | 2012 | | |
| | | % des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE | 16,8% | EDS | 2012 | | n.d. |
| | | % des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs | 56,4% | Enq. Survie de l'enfant | 2009 | | n.d. |
| | % de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII | 28,4% | EDS | 2012 | | ↗ | |
| Causes Fondamentales | Education | % de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus | 40,9% | EDS | 2012 | | ↗ |
| | Population | Taux de fécondité par femme | 5,3 | EDS | 2012 | | → |
| | | % de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne | 31,8% | EDS | 2012 | | ↗ |
| | Genre | % des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative | 15% | EDS | 2012 | | ↗ |

Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Tahoua

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

| | | Indicateurs | Statut | Source | Année | Sévérité | Tendance | |
|---|--|--------------------------------|---|--------|------------------------|----------|----------|------|
| Impact | Nutritionnel | Malnutrition chronique | % de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois | 37,2% | SMART | 2014 | ● | ↘ |
| | | Malnutrition aigue | % de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois | 14,7% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | | % de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois | 2,2% | SMART | 2014 | ● | ↘ |
| | | Carence en vitamine A | % des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A | n.d | n.d | n.d | ○ | n.d. |
| | | Carence en fer | % des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie | 73,6% | EDS | 2012 | ● | ↘ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie | 40,5% | EDS | 2012 | ● | ↘ |
| Carence en iode | Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans | n/a | n/a | n/a | ○ | n/a | | |
| Causes | Sous-jacentes | Sécurité alimentaire | % des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire | 44,4% | Enq Vulnérabilité | 2011 | ○ | ↗ |
| | | Santé et assainissement | Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) | 140 | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé | 68% | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % de ménages ayant accès à l'eau potable | 44% | MHA | 2013 | ○ | ↗ |
| | | Soins | % d'initiation précoce de l'allaitement | 50,2% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | | % des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE | 5,4% | EDS | 2012 | ○ | n.d |
| | | | % des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs | 38,1% | Enq Survie de l'enfant | 2009 | ○ | n.d |
| % de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII | 8,1% | EDS | 2012 | ○ | ↗ | | | |
| Causes | Fondamentales | Education | % de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus | 4,9% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Population | Taux de fécondité par femme | 7,3 | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | | % de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne | 5,8% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Genre | % des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative | 46,4% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |

Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Tillabéry

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

| | | Indicateurs | Statut | Source | Année | Sévérité | Tendance |
|-------------------------|---|---|--------|-------------------------|-------|----------|----------|
| Impact Nutritionnel | Malnutrition chronique | % de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois | 38,5% | SMART | 2014 | ● | ↘ |
| | Malnutrition aigue | % de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois | 13,4% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | % de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois | 2,8% | SMART | 2014 | ● | ↘ |
| | Carence en vitamine A | % des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A | n.d | n.d | n.d | ○ | n.d. |
| | Carence en fer | % des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie | 70,1% | EDS | 2012 | ● | ↘ |
| | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie | 46,4% | EDS | 2012 | ● | ↗ |
| | Carence en iode | Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans | n/a | n/a | n/a | ○ | n/a |
| Causes Sous-jacentes | Sécurité alimentaire | % des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire | 46,4% | Enq. Vulnérabilité | 2011 | ○ | ↗ |
| | Santé et assainissement | Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) | 168 | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé | 68,7% | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | % de ménages ayant accès à l'eau potable | 50% | MHA | 2013 | ○ | ↗ |
| | Soins | % d'initiation précoce de l'allaitement | 45,1% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | % des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE | 9,9% | EDS | 2012 | ○ | n.d |
| | | % des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs | 55,1% | Enq. Survie de l'enfant | 2009 | ○ | n.d |
| | % de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII | 20,8% | EDS | 2012 | ○ | ↗ | |
| Causes Fondamentales | Education | % de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus | 7,8% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | Population | Taux de fécondité par femme | 7,9 | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | % de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne | 11,7% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | Genre | % des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative | 37,5% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |

Tableau de bord de l'Analyse de Situation: Indicateurs à suivre, région de Zinder

- Pas un problème grave
- Problème qui requiert une action
- Problème sérieux qui nécessite une action urgente
- Non applicable

- ➔ Amélioration; tendance positive
- ➔ Détérioration; tendance négative
- ➔ Stabilité; tendance stable
- n.d. Données non disponibles

| | | Indicateurs | Statut | Source | Année | Sévérité | Tendance | |
|---|--|--------------------------------|---|--------|-------------------------|----------|----------|------|
| Impact | Nutritionnel | Malnutrition chronique | % de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois | 48,3% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | Malnutrition aigue | % de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois | 14,8% | SMART | 2014 | ● | ↗ |
| | | | % de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois | 1,9% | SMART | 2014 | ● | ↘ |
| | | Carence en vitamine A | % des enfants de moins de 5 ans ayant une carence en vitamine A | n.d | n.d | n.d | ○ | n.d. |
| | | Carence en fer | % des enfants de 6 à 59 mois ayant de l'anémie | 76,3% | EDS | 2012 | ● | ↘ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant de l'anémie | 50,3% | EDS | 2012 | ● | ↘ |
| Carence en iode | Carence en iode chez les enfants de 6-12 ans | n/a | n/a | n/a | ○ | n/a | | |
| Causes | Sous-jacentes | Sécurité alimentaire | % des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou intermédiaire | 50,2% | Enq. Vulnérabilité | 2011 | ○ | ↗ |
| | | Santé et assainissement | Mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes) | 160 | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % des femmes de 15 à 49 ans ayant des problèmes pour accéder aux soins de santé | 77,1% | EDS | 2012 | ○ | ↘ |
| | | | % de ménages ayant accès à l'eau potable | 63,4% | MHA | 2013 | ○ | ↗ |
| | | Soins | % d'initiation précoce de l'allaitement | 63,4% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | | % des enfants de 6 à 23 mois, nourris selon les 3 pratiques optimales d'ANJE | 2,5% | EDS | 2012 | ○ | n.d |
| | | | % des mères qui se lavent les mains aux cinq moments clefs | 13,5% | Enq. Survie de l'enfant | 2009 | ○ | n.d |
| % de la population (de fait des ménages) dormant sous une MII | 12,6% | EDS | 2012 | ○ | ↗ | | | |
| Causes | Fondamentales | Education | % de femmes qui ont achevé un niveau d'instruction primaire ou plus | 8,4% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Population | Taux de fécondité par femme | 8,5 | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | | % de femmes utilisant une méthode contraceptive moderne | 16% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |
| | | Genre | % des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative | 52,3% | EDS | 2012 | ○ | ↗ |